

Pagsusuri ng reaksyon sa *tuberculin*

Ano ang malalaman mula rito?

Malalaman kung nahawa sa bakterya ng TB

Daloy ng pagsusuri

① Ipaalam kung nagpabakuna sa loob ng 1 buwan o nagkasakit kamakailan lamang.

② Iliniksiyunan sa braso ng likidong tuberculin.

③ Huwag hawakan ang bahaging ininiksiyunan.

※ Hindi masusuri nang wasto kapag lumabas ang likido mula sa bahaging ininiksiyunan.

④ Maaaring maligo sa araw na ito, ngunit huwag kuskusin ang bahaging ininiksiyunan.

⑤ Titingnan ang reaksyon ng bahaging ininiksiyunan pagkatapos ng 48 oras.

Halimbawa, kung nagpasuri ng reaksyon sa tuberculin nang Lunes, titingnan ang reaksyon sa parehong oras ng Miyerkules.



Huwag kabahan, relax lang.



Huwag hawakan ang bahaging ininiksiyunan



Puwedeng maligo
Huwag kuskusin ang bahaging ininiksiyunan



Ipakita ito pagkatapos ng 48 oras

⑥ Ipapaalam ang resulta alinsunod sa hatol na nakasulat sa ibaba.

Negatibo Lumilitaw na walang pagkaha

Ngunit magpatingin kung mayroong sintomas ng sipon

Positibo Para sa walang karanasan ng pagpapabakuna ng BCG — Nahawa.

Magsasagawa ng pagsusuri ng X-ray ng dibdib at kung

may bakas ng diperensya, isasagawa ang paggamot ng TB.

Kung walang bakas ng diperensya, isasagawa ang paggamot para maiwasan ang pagsulong ng sakit

Para sa may karanasan ng pagpapabakuna ng BCG — Maaaring nahawa Magsasagawa ng

⑦ Ayon sa resulta, ipapaalam sa inyo ang schedule ng gagawing pagsusuring pangkalusugan.