

투베르쿨린 반응검사

무엇을 알 수 있습니까?

결핵균 감염 있는 지 유무를 알 수 있습니다.

검사의 흐름

- ① 1 개월 이내에 예방접종을 받은 사람이나 최근에 병을 앓은 사람은 그 사실을 알려 주십시오.
- ② 앞가슴에 주사기로 투베르쿨린 액을 주입합니다.
- ③ 주사 부위는 부어 있는 동안에는 만지지 마십시오.
안의 액이 밖으로 나와버리면 정확한 검사를 할 수 없습니다.
- ④ 당일 입욕은 할 수 있습니다만 주사 부위는 문지르지 않도록 하십시오.
- ⑤ 48 시간 후에 주사 부위의 반응을 확인합니다.
예 월요일에 투베르쿨린 반응검사를 한 경우, 수요일 같은 시간에 반응을 확인합니다.



⑥ 결과는 다음 판정으로 알려 드립니다.

음성	감염은 없었던 것으로 판단됩니다. 하지만 감기 증상이 있을 때는 진찰을 받으시기 바랍니다.
양성	BCG 접종 경력이 없는 사람 - 감염되었습니다. 흉부 엑스레이선 검사를 한 후에 음영이 있으면 결핵 치료를 합니다. 음영이 없으면 발병 예방 치료를 합니다. BCG 접종 경력이 있는 사람 - 감염 가능성이 있습니다. 흉부 엑스레이선 검사한 후에 앞으로의 대응을 결정합니다.

⑦ 결과에 따라 앞으로의 검진 예정을 알려 드립니다.