

การทดสอบทูเบอร์คิวลิน (Tuberculin test)


จะทราบอะไรได้บ้าง

จะทราบว่ามีการติดเชื้อวัณโรคหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจ

- ① สำหรับคนที่มีประวัติการฉีดวัคซีนภายใน 1 เดือน หรือคนที่ไม่สบายเมื่อเร็วๆ นี้ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
- ② จะใช้เข็มฉีดยาใส่น้ำยาทูเบอร์คิวลินเข้าไปที่บริเวณหน้าแขน
- ③ กรุณาอย่าสัมผัสที่บริเวณที่ฉีด
※ ถ้าของเหลวข้างในไหลออกมาข้างนอกจะไม่สามารถตรวจสอบอย่างถูกต้องได้
- ④ วันที่ทำการทดสอบสามารถอาบน้ำได้ แต่พยายามอย่าถูบริเวณที่โดนเข็มฉีดยา
- ⑤ หลังจาก 48 ชั่วโมงแล้ว จะตรวจเช็คบริเวณที่ฉีดยาอีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น) กรณีที่เข้ารับการทดสอบทูเบอร์คิวลิน (Tuberculin test) ในวันจันทร์ จะตรวจเช็คปฏิกิริยาในวันพุธเวลาเดียวกัน



- ⑥ จะรายงานผลโดยตัดสินตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ผลเป็นลบ (negative)	วินิจฉัยได้ว่าไม่ติดเชื้อ แต่ถ้ามีอาการหวัด กรุณาไปพบแพทย์ด้วย
ผลบวก (positive)	คนที่ไม่ม่ประวัติการฉีดวัคซีนBCG - ติดเชื้อแล้ว จะมีการตรวจโดยเอ็กซเรย์บริเวณหน้าอก ถ้าพบว่ามีเงาจะทำการรักษาวัณโรค ถ้าไม่พบเงา จะทำการรักษาโดยป้องกันการเกิดโรค คนที่มีประวัติการฉีดวัคซีนBCG - มีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อ จะมีการตรวจโดยเอ็กซเรย์บริเวณหน้าอก แล้วจึงตัดสินถึงขั้นตอนต่อไป

- ⑦ จะแจ้งให้ทราบถึงวันนัดตรวจครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัย