



BCG खोप क्षयरोग रोक्नका लागि लगाइने खोप हो।

Dr. Toru Mori, Director Emeritus of The Research Institute of Tuberculosis, Japan Anti-Tuberculosis Association
(जापान क्षयरोग वरिधी संघको क्षयरोग अनुसन्धान संस्थानका निर्देशक एमरेटिस) को नरीक्षणमा

तपाईंलाई क्षयरोग अब वगितको रोग हो जस्तो लाग्छ?

क्षयरोग एउटा संक्रामक रोग हो र यो जापानमा अझै पनि वर्षमा करिब 10,000 बरिमीहरू देखिन्छ। धेरैजसो बरिमी ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ यो वयस्कबाट बालबालकामा पनि सर्छ। यसबाहेक, क्षयरोगविरुद्धको प्रतिरक्षा आमाबाट बच्चामा वंशानुगत रूपमा सर्न सक्दैन। शशुहरूमा क्षयरोगविरुद्धको प्रतिरक्षा कमता धेरै बलियो हुँदैन र उहाँहरूलाई समग्र शारीरिक क्षयरोग वा क्षयरोगजन्य मेनन्जाइटिस हुन सक्छ र गम्भीर दीर्घकालीन असरहरू बाँकी रहन सक्छन्।

BCG खोप भनेको के हो?

BCG खोप माइकोब्याक्टेरियम बोभिसलाई कमजोर बनाइ तयार गरिएको जीवित खोप हो। खोप लगाउने कार्य माथिल्लो हातको बाहरी भागमा दुई ठाउँमा बहु पन्चर यन्त्र राखी त्यसमा थचि गरिन्छ।



नयिमति BCG खोप तालिका

BCG खोप 1 वर्षको उमेरभित्र लगाइन्छ। मानक खोपको अवधि 5 देखि 7 महानिका उमेरबचि हो तर केही क्षेत्त्रमा यो अझै छट्टी (3 महानिका उमेरपछि) पनि लगाउन सक्छ। कुनै बालबालकाले माथि उल्लेखित अवधिमा, दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने रोग लाग्नुजस्ता कारणले खोप लगाउन नसकेको अवस्थामा, खोप लगाउन योग्य भएको मतिपिछ 2 वर्षभित्र तर 4 वर्षको उमेर पुग्नुअघि उक्त बच्चाले खोप लगाउन सक्छन्।



シールハイハイ

खोप लगाइसकेपछिका सावधानीहरू

खोप लगाएको ठाउँ प्रत्यक्ष घामबाट जोगाउँदै सुकखा राख्नुपर्छ।
खोप लगाएको दिन पनी बालबालकाले नुहाउन सक्छन् तर खोप लगाएको ठाउँमा मचिने वा कोट्याउने नगर्नुहोस्।

खोप लगाइसकेपछिको प्रगत

खोप लगाएको करबि 10 दिनपछि, खोप लगाएको ठाउँमा रातो सानो बबिरि देखि सक्छ र त्यसपछि त्यसमा थोरै पीप जम्न सक्छ। खोप लगाएको 4 देखि 6 हप्तामा यो प्रतिक्रिया सबैभन्दा बढी देखिन्छ, त्यसपछि पाप्रो बस्ने छ र खोप लगाएको करबि 3 देखि 4 महिनामा नकिो भएर सानो दाग मात्र बाँकी रहने छ। यो सामान्य प्रतिक्रिया हो र यसले BCG खोपमार्फत प्रतरीधात्मक क्षमता प्राप्त भएको प्रमाणित गर्दछ। यस्ता छालाका अवस्थाहरूमा पट्टी वा प्लास्टर स्ट्रिप्स नलगाउनुहोस्, केवल सफा राख्नुहोस्।

खोप लगाइसकेपछिको सामान्य प्रगत



प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू

खोप लगाएको ठाउँ खोप लगाएको 3 महिना वा त्यसभन्दापछि पनरिसाउन सक्छ वा सुकसिकेपछि फेरि रसाउन सुरु हुन सक्छ।
यसबाहेक, दुर्लभ अवस्थामा, BCG खोप लगाइएको तरिकै काखीमुनकिो गर्नुथासुनन सक्छ। सामान्यतया, यस अवस्थालाई केवल अवलोकन गरे पुग्छ तर कहलिकाहीं सुननएकिो ठाउँ धेरै ठुलो हुने, पाक्ने, आफैँ फुट्ने र पीप बग्नु सक्ने हुन सक्छ।
बालबालकामा यीमध्ये कुनै पनी लक्षण देखिएमा वा अवस्थामा केही परिवर्तन महसुस भएमा कृपया आफ्नो चकित्सकसँग परामर्श लनुहोस्।

कोच फेनोमेन (The Koch's phenomenon)

खोप लगाएपछि प्रतिक्रिया अपेक्षाभन्दा छिट्टै देखा पर्छ भने

कषयरोगबाट पहलि नै संक्रमित भएका शशुहरूलाई BCG खोप लगाउँदा, खोप लगाएको ठाउँमा सामान्यभन्दा धेरै चाँडै (खोप लगाएको 1 देखि 5 दिनभित्र) कडा प्रतिक्रिया देखा पर्न सक्छ। यसलाई कोच फेनोमेन भनिन्छ।

तपाईंलाई कोच फेनोमेन सुरु भएको शङ्का लागेमा:

1 तपाईंले यी परिवर्तनहरू देखनुभयो भने 2 देखि 3 दिनभित्र खोप लगाउने चकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा देखाउनुहोस्।

कोच फेनोमेन सुरु हुनु भनेको बच्चा थाहा नपाई पहलि नै कषयरोगबाट संक्रमित भएको हुन सक्छ। तपाईंको बच्चा वास्तवमै कषयरोगबाट संक्रमित छ कि छैन भन्ने जाँच गर्नुपर्छ। तपाईंको बच्चा समूहगत खोप कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो वा तपाईं आफ्नो प्राथमिक चकित्सकसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया आफ्नो नगरपालिकाअन्तर्गतको खोप वधिगामा सम्पर्क गर्नुहोस्। कृपया यो आपत्कालीन बाह्य क्लिनिक (Emergency Outpatient Clinic) मा तुरुन्तै जानुपर्ने जस्तो गम्भीर अवस्था होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कृपया जापानमा पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालकामा कषयरोग संक्रमण दर नकिे कम रहेको छ र धेरै अवस्थामा पछि जाँच गर्दा बालबालका कषयरोगबाट संक्रमित नभएको पुष्टि भएकाले नआतनुहोस्।

2 खोप लगाइसकेपछि सुनननि अवस्था 2 देखि 4 हप्ताभित्र कम हुन थाल्छ

खोप लगाएको ठाउँको छाला रातो भएमा, सुननरिमा वा पीप आउन थालेमा पनी त्यसमा गज मात्र लगाउनु पर्याप्त हुन्छ। खोप लगाएको 2 देखि 4 महिनापछि छाला नकिो हुने छ र दाग मात्र देखिने अवस्थामा पुग्ने छ।

कोच फेनोमेनका उदाहरणहरू



2 दिन

5 दिन

7 दिन

(खोप लगाइसकेपछि)

सामान्यतया, यसमा खोप लगाएको 3 दिनभित्रै द्रुत परिवर्तनहरू (जस्तै: सुनननि, पीप जम्ने आदी) देखिने गर्दछ।

सामान्यतया अवस्था सामान्यभन्दा छिट्टै नकिो हुन्छ।

