

结核菌素反应检查

该检查能告诉我们什么？

我们可以知道您是否感染了结核病菌。

检查流程

- ① 一个月内打过预防针的人以及最近生过病的人，请告诉我们。
- ② 在前臂皮内注射结核菌素稀释液。
- ③ 请不要触摸注射部位。
※如果注射部位的药液外漏的话，无法得到正确的检查结果。
- ④ 注射当天可以洗澡，但不要揉搓注射部位。
- ⑤ 48 小时后，确认注射部位的反应情况。
例) 星期一进行结核菌素的检查，星期三在同一时间确认反应情况。



不要使力，尽量放松。



不要触摸注射部位。



可以洗澡，
但不要揉搓注射部位。



48 小时后，
我们将检查反应情况。

结果将通过下面的判断结果通知书通知您。

阴性	可以认定无感染。 但出现感冒症状时，请就医。
阳性	没有打过 BCG（卡介苗）预防针的人，可以确定已感染。 先进行 X 光检查，如有阴影，要接受结核治疗。 如无阴影，要接受预防发病治疗。 打过 BCG（卡介苗）预防针的人，有可能已感染。 先进行 X 光检查后，再决定今后的治疗方案。

- ⑥ 根据结果，我们会通知今后体检的日期。