

ट्यूबरक्यूलिन छाला जाँच

यसबाट के देखिन्छ?

कसैलाई ट्यूबरकुल ब्यासिलस नामक जीवाणुको सङ्क्रमण भएको छ वा छैन भन्ने थाहा हुन्छ।

एकजामिनेशन फलो चार्ट

- ① यदि विगतको एक महिना भित्र तपाईं बिरामी पर्नु भएको अथवा कुनै खोप लिनु भएको छ भने चिकित्सकलाई भन्नुहोस्।
- ② पाखुरामा ट्यूबरक्यूलिन तरल भएको एउटा सुई दिइन्छ।
- ③ जस्तै यदि तपाईंले सोमवार जाँच गराएको हो भने बुधवार त्यसै बेलासम्म याद गर्दै गर्नुहोस्।
कृपया सुई लगाएको ठाउँमा नछुनुहोस्।
- ④ सुई लगाएको दिनमा नुहाउनु हुन्छ तर सुई लगाएको ठाउँमा नखोसनुहोस्।
- ⑤ आउने 48 घण्टा सम्म कृपया केही प्रतिक्रिया हुन सक्ने भएकोले सुई लगाएको ठाउँमा हेर्दै गर्नुहोस्।



सजिलो मान्नुहोस्



सुई लगाएको ठाउँमा
नछुनुहोस्।



नुहाउनु हुन्छ। सुई
लगाएको ठाउँ नखोसनुहोस्।



48 घण्टा बितेपछि
देखाउनुहोस्।

- ⑥ तपाईंलाई भनिएको नतिजा निम्न अनुसारको हुन सक्छ।

नकारात्मक (सङ्क्रमण छैन) हाम्रो विचारमा सङ्क्रमण छैन।

तथापि, यदि तपाईंलाई चिसो लागेको जस्तो लक्षणहरू देखिएमा, कृपया
आफ्नोप्राथमिक चिकित्सकलाई देखाउनुहोस्।

सकारात्मक (सङ्क्रमण छ)

BCG खोप लगाएको थाहा नभएको मानिसहरू, तपाईं सङ्क्रमित हुनुहुन्छ।
एउटा एक्स-रे गराउनुहोस्, यदि श्याडो देखिएमा, क्षयरोगको उपचार गराइन्छ।
यदि श्याडो (अँध्यारो भाग) देखिएन भने रोकथाम-मूलक औषधि दिइने छ।
BCG खोप लगाएको थाहा नभएको मानिसहरू, सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ।
छातीको एक्स-रे गराउनुहोस् र भविष्यमा उपचारबारे निर्णय गर्नुहोस्।

- ⑦ नतिजाका आधारमा, तपाईंको भविष्यको स्वास्थ्य जाँच मितिहरूबारे जानकारी गराइन्छ।