

## Teste de reação à tuberculina

### O que é verificado?

É verificado se está infectado com *Mycobacterium tuberculosis*.

### Fluxo do Exame

- ① Se foi aplicada a vacina preventiva dentro de 1 mês, ou se adoeceu ultimamente, avise sobre o fato.
- ② Será injetada a solução de tuberculina no antebraço.
- ③ Não toque o local da injeção.  
\*Se a solução injetada sair, não será possível realizar um exame preciso.
- ④ É possível se banhar no dia, porém, não esfregue o local da injeção.
- ⑤ Verificar-se-á a reação do local da injeção após 48 horas.

Ex.) Se o exame de reação à tuberculina for realizada na segunda-feira, a reação será verificada no mesmo horário de quarta-feira.



- ⑥ O resultado será informado de acordo com o julgamento abaixo.

Negativo	Acredita-se que não há infecção Porém, no caso de aparecerem sintomas de febre, receba atendimento médico
Positivo	Pessoa sem histórico de vacinação de BCG: Está infectado Faremos um exame de raio-X do tórax, e se houver sombras, faremos o tratamento da tuberculose Se não houver sombras, faremos o tratamento profilático da doença
	Pessoa com histórico de vacinação de BCG: Há possibilidade de estar infectado Faremos um exame de raio-X do tórax, para decidir as medidas futuras a tomar.

- ⑦ Dependendo do resultado, informaremos o cronograma dos exames futuros