

Xét nghiệm phản ứng Tuberculin

Xét nghiệm phản ứng Tuberculin sẽ biết được điều gì?

Xét nghiệm phản ứng Tuberculin sẽ biết được có bị nhiễm trực khuẩn lao hay không?

Quy trình xét nghiệm

- ① Bệnh nhân hãy báo trước nếu đã được tiêm chủng dự phòng trong vòng 1 tháng, hoặc mới bị bệnh gần đây.
- ② Tiêm dung dịch Tuberculin bằng ống tiêm vào mặt trước cánh tay.
- ③ Cố gắng không chạm vào chỗ tiêm.
*Nếu dung dịch bên trong chỗ tiêm bị chảy ra ngoài thì xét nghiệm sẽ không còn chính xác.
- ④ Có thể tắm trong ngày hôm đó nhưng không được chà xát tại chỗ tiêm.
- ⑤ Xác nhận phản ứng tại chỗ tiêm sau 48 giờ.

Ví dụ: Trong trường hợp thực hiện xét nghiệm phản ứng Tuberculin vào thứ 2 thì sẽ xác nhận phản ứng tại cùng thời điểm vào thứ 4.



Hãy thả lỏng cơ thể



Không chạm vào chỗ tiêm



Có thể tắm nhưng không được
chà xát chỗ tiêm



Hãy quan sát sau 48 giờ

- ⑥ Thông báo kết quả theo chuẩn đoán dưới đây.

Âm tính Xét nghiệm cho thấy không bị nhiễm lao
Tuy nhiên, nếu có tình trạng sốt thì hãy đi khám sức khỏe

Dương tính Người chưa có tiền sử tiêm chủng BCG - Bị nhiễm lao.
Thực hiện xét nghiệm X-quang vùng ngực, nếu phim chụp có bóng mờ thì tiến hành điều trị bệnh lao
Nếu phim chụp không có bóng mờ, tiến hành điều trị dự phòng phát bệnh
Người đã có tiền sử tiêm chủng BCG - Có khả năng bị nhiễm lao
Thực hiện xét nghiệm X-quang vùng ngực để quy định biện pháp sắp tới

- ⑦ Tùy vào kết quả, chúng tôi sẽ thông báo lịch trình khám sức khỏe sắp tới.