

Q9 E depois de terminar de tomar o medicamento?

Faça o exame de raio-x do tórax logo após terminar o período do medicamento de 6 meses, 6 meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois e 2 anos depois, para verificar se não há o desenvolvimento da doença da tuberculose.

Outrossim, no caso de aparecerem sintomas tais como tosse, catarro, dor torácica, febre, etc., receba atendimento médico o mais breve possível.

Se os sintomas tais como tosse, catarro, dor torácica, febre, etc., persistirem durante o tempo que estiver tomando o medicamento ou mesmo depois de terminar de tomá-lo, receba atendimento médico, explique o andamento até o momento ao médico, e faça o exame de raio-x do tórax.

O Posto de Saúde fornece consultoria a qualquer momento sobre tratamento médico, recuperação, medicação, etc. da tuberculose. Quaisquer dúvidas ou preocupações, consulte-se no Posto de Saúde.

Enfermeiro(a) de saúde pública responsável

この冊子は 1600 部作成し、1 冊あたりの単価は 617 円です。

(ポルトガル語)

Tratamento da Infecção Latente por Tuberculose

Q & A

大阪府

Previna o Desenvolvimento da Doença da Tuberculose!

Foram realizados o teste de reação à tuberculina e o teste QFT para verificar se o(a) Sr(a). está infectado(a) com a tuberculose.

O resultado do exame do(a) Sr(a). () é:

	Teste de tuberculina	Teste QFT	Exame de raio-X do tórax
Data do exame	(ano) (mês) (dia)	(ano) (mês) (dia)	(ano) (mês) (dia)
Resultado			Sem anormalidades

Devido ao resultado acima, o(a) Sr(a) necessita de quimioprevenção.

Q1 O que é Tratamento da Infecção Latente por Tuberculose?

É tomar medicamentos para prevenir o desenvolvimento da doença, quando acredita-se que há um alto risco de desenvolvimento da doença pela infecção da tuberculose. Ou seja, toma-se o medicamento para prevenir o desenvolvimento da tuberculose. (Quimioprevenção)



Q2 Como é verificada a infecção?

Diz-se infecção da tuberculose ao estado de encontrar as bactérias *Mycobacterium tuberculosis* dentro do nosso organismo. E o exame para se verificar a infecção é o teste de reação à tuberculina/ teste QFT.



Q3 A infecção é diferente do desenvolvimento da doença?

Mesmo que as bactérias *Mycobacterium tuberculosis* entrem no nosso organismo, elas não se desenvolverão se tivermos um sistema imune forte. Porém, estas bactérias dominadas não estão mortas, estando somente em estado latente dentro do corpo. E quando o nosso organismo ficar com o sistema imune enfraquecido, as bactérias começam a entrar em atividade, "desenvolvendo a doença" da tuberculose.

O desenvolvimento da doença se dá em muitos casos dentro de 2 anos após a infecção, diminuindo após este período, porém, com a possibilidade contínua de desenvolver a doença por toda a vida.



Q4 Como é feita a quimioprevenção?



Toma-se diariamente um medicamento chamado isoniazida (INH) por 6 meses. A isoniazida (INH) é um medicamento que combate gradativamente as bactérias *Mycobacterium tuberculosis* que se encontram dentro do nosso organismo. O medicamento é geralmente de uma dose por dia, e é importante continuar a tomá-lo todos os dias regularmente, sem esquecer, por durante 6 meses.

Q5 Qual é o efeito da quimioprevenção?

Diz-se que o efeito da quimioprevenção, no caso de o medicamento ser tomado diariamente por 6 meses sem falta, o desenvolvimento da doença da tuberculose poderá ser dominada em cerca de 70%, em comparação a casos de não ser administrado o medicamento; e seu efeito continua por mais de 10 anos. Tomar o medicamento de forma irregular, tal como tomar ou deixar de tomar, ou no caso de não tomar por tempo suficiente fará com que a eficácia da quimioprevenção seja comprometida, aumentando o risco de desenvolvimento da doença da tuberculose.



Q6 Quais os cuidados que devem ser tomados durante a quimioprevenção?

Você não terá nenhuma restrição na sua vida. Não haverá nenhum problema na sua vida cotidiana, no seu trabalho ou nas atividades escolares, podendo ser levada a sua vida como antes.



Q7 Não há problema com efeitos colaterais?

A isoniazida (INH) é um medicamento já utilizado por muito tempo para a prevenção e tratamento da tuberculose em todo o mundo, e tem poucos efeitos colaterais. Mas, apesar de raramente, poderá causar declínio da função hepática, dormência na ponta dos dedos, perda de apetite, eczemas, etc. Nesse caso, consulte o seu médico responsável.

Q8 Como fica a despesa?

★É possível se beneficiar do Sistema de Subsídio Público para Despesas de Tratamento da Tuberculose, e reduzir o valor do pagamento por conta própria. Para o requerimento do subsídio, leve o Formulário de Requerimento de Subsídio Público para Despesas de Tratamento da Tuberculose (escrito pelo seu médico responsável) juntamente com o filme de raio-X do tórax no Posto de Saúde de jurisdição da sua residência.